

Monterey Garden Insect Spray RTU

**For Use on Vegetables, Fruit and Nut Trees,
Citrus, Berries, Herbs, Ornamentals, Shrubs,
Flowers, Lawns, and Trees in Home Gardens
and Non-Commercial Greenhouses**

**Para Uso en Vegetales, Frutales y Nueces,
Cítricos, Bayas, Hierbas, Ornamentales, Arbustos,
Flores, Césped, y Árboles en Jardines e
Invernaderos No Comerciales**

**Effective Against a Wide Variety of Insects
Eficaz Contra una Gran Variedad de Insectos**



For Organic Gardening
Para Jardinería Orgánica



Active Ingredients:	By Wt.
Potassium Salts of Fatty Acids	0.940%
Spinosad (a mixture of spinosyn A and spinosyn D).....	0.005%
Other Ingredients:.....	99.055%
Total:.....	100.000%

EPA Reg. No. 67702-45-54705

EPA Est. No. 48498-CA-1

Sold under a license of W. Neudorff GmbH KG, Germany.



NET CONTENTS: 1 QT/ 32 FL OZ / 946 mL

Distributed by/Distribuido por:
LAWN AND GARDEN PRODUCTS, INC.
P. O. Box 35000 • Fresno, CA 93745 • (559) 499-2100
info@montereylawngarden.com

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION

FIRST AID

If In Eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

If On Skin or Clothing: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. For emergency information concerning this product, call the National Pesticide Information Center at 1-800-858-7378, 6:30 am to 4:30 pm Pacific Time, seven days a week. (NPIC Web site: www.npic.orst.edu). During other times, call the poison control center at 1-800-222-1212.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

CAUTION: Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes, skin, or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

This product is toxic to bees exposed to treatment for 3 hours following treatment. Do not apply this pesticide to blooming, pollen-shedding or nectar-producing parts of plants if bees may forage on the plants during this time period. This product is toxic to aquatic invertebrates. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters, or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area.

PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS

Combustible. Do not use or store near heat or open flame.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

For outdoor residential use in home gardens, lawns, and ornamentals and greenhouses (non-commercial). Not for use on plants being grown for sale or other commercial use, or for commercial seed production, or for research purposes.

Read entire label before using. Use only as directed.

Shake container well before use. Apply when listed pests are present. Thoroughly spray all plant parts to wetting, including undersides of leaves. Repeat applications may be made as indicated in the Use Restrictions section.

Apply when the first signs of powdery mildew appear and repeat at 7-10 day intervals. Do not exceed restrictions listed in the Use Restrictions section. This product must come into contact with powdery mildew to be effective. Complete coverage is essential for maximum control.

Do not use on sweet peas, nasturtiums, or delicate ferns. Use with care on new seedlings, transplants, and blooms. Do not spray during full sun. If concerned about sensitivity of plants, apply to individual plants or small areas of plants and wait 2 days to determine if plant damage occurs prior to treatment of larger areas.

PESTS

Insects: This product will control pests such as: adelgids (woolly aphids), ants (excluding fire ants, harvester ants, Pharaoh's ants and carpenter ants), aphids, armyworms, beetles (including Colorado potato beetle), borers, caterpillars, chinch bugs, codling moth, earwigs, fruit flies (including spotted wing *Drosophila*), gypsy moth, lace bugs, leafhoppers, leafminers, leafrollers, loopers, mealybugs, mites, mole crickets, plant bugs, psyllids, sawfly larvae (e.g. pear and rose slugs), scale insects, spider mites, tent caterpillars, thrips, webworms, weevils (including black vine weevil), and whiteflies.

Powdery Mildew: This product provides curative control of powdery mildew.

USE SITES:

Vegetables, including: artichokes (globe), asparagus, beans, beets, broccoli, Brussels sprouts, cabbage, cantaloupe, carrots, cauliflower, corn, cucumbers, eggplants, garlic, lettuce, onions, peas, peppers, potatoes, radishes, rutabagas, spinach, squash, Swiss chard, tomatoes and turnips;

Fruits, including: apples, avocados, apricots, cherries, grapes, melons, peaches, plums, citrus, pears;

Berries, including strawberries, blackberries, blueberries, boysenberries, loganberries, raspberries;

Herbs, including: angelica, balm, basil, borage, burnet, chamomile, catnip, chervil (dried), chive, clary, coriander, costmary, cilantro, curry, dillweed, horehound, hyssop, lavender, lemongrass, lovage, marigold, marjoram, mint, nasturtium, parsley, pennyroyal, rosemary, rue, sage, savory, sweet bay, tansy, tarragon, thyme, wintergreen, woodruff and wormwood;

Peanuts, Pistachios, Tree nuts, including: almond, cashew, chestnut, filbert, macadamia nut, pecan, walnut;

Outdoor Ornamentals; Greenhouses (Non-Commercial); Outdoor Container Grown Plants; Lawns; Turf.

USE RESTRICTIONS

PHI – Do not apply within this many days of harvest.

Timing – Do not make applications less than this many days apart.

Max # of Applications – Do not make more than the specific number of applications for the given time period.

BERRIES

PHI	Crop	Timing	Max # of Applications
1 day	Caneberries (blackberry, loganberry, raspberry)	5 days	6/year*
	Strawberry	5 days	5/year
3 days	Bushberries (blueberry, currant, elderberry, gooseberry, huckleberry)	6 days	3/crop or 6/year
21 days	Cranberry	7 days	6/year

* year = calendar year

FRUITS

PHI	Crop	Timing	Max # of Applications
1 day	Citrus (grapefruit, lemons, limes, oranges, tangerines)	6 days	3/year*
	Tropical tree fruits (avocado, guava, mango, papaya, passion fruit)	7 days	2/year
	Stone fruits (nectarines, peaches)	7 days	N/A
7 days	Grape	5 days	5/year
	Stone fruits (cherries, plums, prunes)	7 days	N/A
	Fig	7 days	4/year
	Dates	7 days	N/A
	Pome fruits (apples, crabapples, pears, mayhaw, quince)	10 days	4/year
	Pomegranate	N/A	N/A
	Pineapple (only for use in Hawaii)	7 days	6/year
14 days	Apricots	7 days	N/A
8 weeks	Banana and plantain (California, Florida, Hawaii and Texas only)	7 days	4/crop or 6/year

* year = calendar year

VEGETABLES

PHI	Crop	Timing	Max # of Applications
1 day	Bulb vegetables (onion, garlic, green onion, leek, shallot)	4 days	5/year*
	Brassica (cole) crops (bok choy, broccoli, Brussels sprouts, cabbage, cauliflower, collards, kale)	4 days	6/year
	Corn (sweet corn, popcorn, seed corn)	N/A	6/year
	Cucumber	N/A	6/crop
	Fruiting vegetables	4 days	6/year

	(eggplant, pepper, tomato) and okra		
	Leafy vegetables (except Brassica; arugula, celery, lettuce, dock, endive, fennel, parsley, rhubarb, spinach, Swiss chard); watercress	4 days	6/year
2 days	Artichoke	7 days	4/crop
3 days	Legume vegetables (beans, peas, blackeyed peas)	5 days	6/crop
	Cucurbits (melons, cantaloupe, pumpkin, squash, watermelon)	5 days	6/crop
	Leaves of root, tuber and legume vegetables	4 days	6/year
	Root vegetables — Carrot, ginseng, parsnip	5 days	4/year
	Root vegetables — Radish, rutabaga, turnip	5 days	3/year
	Tuberous and Corm Vegetables (beets, sugarbeets)	7 days	4/crop
7 days	Potatoes, ginger, sweet potatoes, yams	7 days	4/crop
60 days	Asparagus**	4 days	3/crop

* year = calendar year

**For postharvest protection of ferns only. Do not apply within 60 days of spear harvest. Do not feed treated ferns to meat or dairy animals.

TREE NUTS, PEANUTS AND PISTACHIOS

PHI	Crop	Timing	Max # of Applications
1 day	Tree nuts (almond, cashew, chestnut, filbert, macadamia nut, pecan, walnut); Pistachios	7 days	N/A
3 days	Peanut (not for use in California)	7 days	3/year*

* year = calendar year

HERBS

PHI	Crop	Timing	Max # of Applications
1 day	Herbs (angelica, balm, basil, borage, burnet, chamomile, catnip, chervil (dried), chive, clary, coriander, costmary, cilantro, curry, dillweed, horehound, hyssop, lavender, lemongrass, lovage, marigold, marjoram, nasturtium, parsley, pennyroyal, rosemary, rue, sage, savory, sweet bay, tansy, tarragon, thyme, wintergreen, woodruff and wormwood)	5 days	3/crop or 5/year*
7 days	Mint	4 days	3/crop or 4/year

* year = calendar year

LAWNS, TURF, OUTDOOR CONTAINER-GROWN PLANTS AND ORNAMENTALS (HERBACEOUS AND WOODY)

Uniformly spray foliage to point of runoff. Uniform coverage of upper and lower leaf surfaces is essential for effective insect control. Do not make applications less than 7 days apart.

GREENHOUSES (NON-COMMERCIAL)

Make localized area treatments of ornamental plants where pest problems are anticipated to occur rather than general area-wide broadcast treatments. Do not apply this product more than 10 times per year inside a greenhouse. If this product is being used for thrips, leafminer, spider mite and/or diamondback moth control, do not apply more than 6 times per year inside a greenhouse.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food, or feed by storage and disposal.

PESTICIDE STORAGE: Store this product in its original container and keep in a secure storage area out of reach of children and domestic animals.

CONTAINER DISPOSAL: If empty: Nonrefillable. Do not reuse or refill this container. Place in trash or offer for recycling if available. **If partly filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

WARRANTY

Seller warrants that this product conforms to the chemical description on this label and is reasonably fit for the purposes stated on this label only when used in accordance with directions under normal conditions. To the fullest extent permitted by law, this warranty does not extend to use of this product contrary to label directions, or under abnormal use conditions, or under conditions not reasonably foreseeable to seller. Seller makes no other warranties, either express or implied.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PRECAUCIÓN

PRIMEROS AUXILIOS

En los Ojos: Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Retire los lentes de contacto, si los tiene, después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagándose los ojos. Llame a un centro de control de venenos o a un médico para consejos sobre tratamiento.

En la Piel o Ropa: Quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente durante 15 a 20 minutos. Llame a un centro de control de venenos o a un médico para consejos sobre tratamiento.

Tenga con usted el envase del producto o la etiqueta cuando llame a un centro de control de venenos o médico, o vaya por tratamiento. Para información de emergencia concerniente a este producto, llame al Centro Nacional de Información de Pesticidas al 1-800-858-7378, 6:30 am a 4:30 pm hora del Pacífico, siete días a la semana. (Página web NPIC: www.npic.orst.edu). Durante otras horas llame al centro de control de venenos al 1-800-222-1212.

DECLARACIONES PREVENTIVAS RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN: Causa irritación moderada en los ojos. Evite el contacto con los ojos, piel o ropa. Evite el contacto con los ojos, piel o ropa. Lávese a fondo con jabón y agua después de manipularlo y antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o ir al baño.

RIESGOS AMBIENTALES

Este producto es tóxico para las abejas expuestas al tratamiento durante 3 horas después del mismo. No aplique este pesticida a plantas en floración o partes que producen polen o néctar si las abejas pueden buscar comida en las plantas durante este período. Este producto es tóxico para invertebrados acuáticos. Para proteger el medio ambiente no permita que el pesticida entre o se vierta en alcantarillas, zanjas de drenaje, cunetas o aguas superficiales. Aplicar este producto en tiempo apacible cuando no se predice lluvia en las próximas 24 horas, ayudará a asegurar que el viento o la lluvia no arrastran o lavan el pesticida de la zona de tratamiento.

RIESGOS FÍSICOS O QUÍMICOS

Combustible. No usar o almacenar cerca de fuentes de calor o llama directa.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

Es una violación de la Ley Federal usar este producto de forma inconsistente con lo descrito en la etiqueta.

Para uso residencial exterior en jardines de casa, césped, y plantas ornamentales e invernaderos (no comerciales). No debe usarse en plantas cultivadas para la venta u otro uso comercial, o para la producción comercial de semillas, o para fines de investigación.

Lea toda la etiqueta antes de usarlo. Use solamente según las instrucciones.

Agite bien el contenedor antes de usarlo. Aplique cuando las plagas listadas estén presentes. Pulverice a fondo todas las partes de la planta hasta que se mojen, incluyendo el reverso de las hojas. Pueden hacerse aplicaciones repetidas según se indica en la sección Restricciones de Uso.

Aplique cuando aparezcan las primeras señales de oídio y repita a intervalos entre 7 y 10 días. No exceda las restricciones listadas en la sección de Restricciones de Uso. Para ser eficaz, este producto debe estar en contacto con el oídio. Para un control máximo, la cobertura completa es esencial.

No lo use en guisantes dulces, capuchinas, o helechos delicados. Use con cuidado en plantas de semillero nuevas, trasplantes y capullos. No pulverice a pleno sol. Si le preocupa la sensibilidad de las plantas, aplíquelo a plantas individuales o pequeñas áreas de plantas y espere 2 días para determinar si se produce daño a la planta antes de tratar áreas más grandes.

PLAGAS

Insectos: Este producto controlará plagas tales como: áfidos (pulgones lanudos), hormigas (excluyendo hormigas rojas, hormigas cosechadoras, hormigas del Faraón y hormigas carpinteras), áfidos, cogolleros, escarabajos (incluyendo el escarabajo de Colorado de la patata), perforadores, orugas, chinches, carpocapsa, tijeretas, moscas de la fruta (incluyendo la *Drosófila* de alas moteadas), polilla gitana asiática, tingidae, cicadellidae, minador de las hojas, enrollador de hojas, oruga agrimensora, pseudococcidae, ácaros, grillos topo, muridae, psílidos, larvas de moscas de sierra (ej. babosa del peral y rosal), cochinillas de la viña, tetranychidae, malcosoma americanum, tisanóptaros, gusanos telarañeros, gorgojos (incluyendo el gorgojo negro de la viña), y moscas blancas.

Oídio: Este producto proporciona control curativo del oídio.

LUGARES DE USO:

Vegetales, incluyendo alcachofas (cardos), espárragos, frijoles, remolachas, brócoli, coles de Bruselas, repollo, melón cantalupo, zanahorias, coliflor, maíz, pepinos, berenjenas, ajo, lechuga, cebollas, guisantes, pimientos, patatas, rábanos, colinabos, espinacas, calabacín, acelgas suizas, tomates y nabos;

Frutas, incluyendo manzanas, aguacates, albaricoques, cerezas, uvas, melones, melocotones, ciruelas, cítricos, peras;

Bayas, incluyendo fresas, moras, arándanos, moras de Boysen, mora roja, frambuesas;

Hierbas, incluyendo: angélica, melissa, albahaca, borraja, pimpinela, manzanilla, menta gatuna, perifollo (seco), cebolletas, salvia sclarea, cilantro, hierba de San Pedro, cilantro, curry, eneldo, marrubio, hisopo, lavanda, hierba limón, levístico, caléndula, mejorana, menta, capuchina, perejil, menta poleo, romero, ruda, salvia, ajedrea, laurel, tanacet, tarragón, tomillo, gaultheria, asperula odorata, y ajenjo;

Cacahuets, pistachos, nueces, incluyendo: almendras, anacardos, castañas, avellanas, macadamias, pecanas, nueces;

Plantas ornamentales exteriores; invernaderos (no-comerciales); plantas exteriores en maceteros; césped; pasto.

RESTRICCIONES DE USO

PHI – No aplicar en estos días antes de la cosecha.

Tiempo – No realizar aplicaciones al menos con un intervalo de estos días.

Número Máximo de Aplicaciones – No realizar más que el número específico de aplicaciones para el período de tiempo dado.

BAYAS

PHI	Cosecha	Tiempo	No. máximo de Aplicaciones
1 día	Bayas de Rubus (moras, moras rojas, frambuesas)	5 días	6/año*
	Fresas	5 días	5/año
3 días	Bayas (arándanos, grosellas, saucos, grosellas espinosas, arándanos negros)	6 días	3/cosecha o 6/año
21 días	Arándano rojo	7 días	6/año

* año = año natural

FRUTAS

PHI	Cosecha	Tiempo	No. máximo de Aplicaciones
1 día	Cítricos (toronjas, limones, limas, naranjas, mandarinas)	6 días	3/año*
	Frutas de árboles tropicales (aguacate, guava, mango, papaya, maracuyá)	7 días	2/año
	Frutas con hueso (nectarinas, melocotones)	7 días	N/A
7 días	Uvas	5 días	5/año
	Frutas con hueso (cerezas, ciruelas, ciruela pasa)	7 días	N/A
	Higos	7 días	4/año
	Dátiles	7 días	N/A
	Pomos (manzanas, manzanas silvestres, peras, mayhaw, membrillos)	10 días	4/año
	Granadas	N/A	N/A
	Piña (solo para uso en Hawaii)	7 días	6/año
14 días	Albaricoques	7 días	N/A
8 semanas	Plátano y guineo (California, Florida, Hawaii y Texas solamente)	7 días	4/cosecha o 6/año

* año = año natural

VEGETALES

PHI	Cosecha	Tiempo	No. máximo de Aplicaciones
1 día	Vegetales con bulbo (cebolla, ajo, cebolla verde, puerro, chalote)	4 días	5/año*
	Brassica (col) cosechas (repollo chino, brócoli, coles de Bruselas, repollo, coliflor, berza, col rizada)	4 días	6/año
	Maíz (maíz dulce, maíz de palomitas, maíz de semilla)	N/A	6/año
	Pepino	N/A	6/cosecha
	Vegetales con fruto (berenjena, pimiento, tomate) y okra	4 días	6/año
	Vegetales de hoja (excepto Brassica; arúgula, apio, lechuga, acedera, endivia, hinojo, perejil, ruiubarbo, espinaca, acelga suiza); berro	4 días	6/año
2 días	Alcachofa	7 días	4/cosecha

3 días	Legumbres vegetales (frijoles, guisantes, frijol chino)	5 días	6/cosecha
	Cucurbitáceas (melones, melón cantalupo, calabaza, calabacín, sandía)	5 días	6/cosecha
	Hojas de raíces, tubérculo y legumbres vegetales	4 días	6/año
	Vegetales de raíz — zanahoria, ginseng, pastinaca	5 días	4/año
	Vegetales de raíz — rábano, colinabo, nabo	5 días	3/año
	Vegetales tuberosos y bulbosos (remolacha, remolacha azucarera)	7 días	4/cosecha
7 días	Patatas, jengibre, boniatos, ñames	7 días	4/cosecha
60 días	Espárragos**	4 días	3/cosecha

* año = año natural

**Para protección de los helechos solamente después de la cosecha. No aplicar 60 días antes de la recolección. No dar los helechos tratados a animales productores de carne o leche.

NUECES, CACAHUETES Y PISTACHOS

PHI	Cosecha	Tiempo	No. máximo de Aplicaciones
1 día	Nueces (almendras, anacardos, castañas, avellanas, macadamias, pecanas, nueces); pistachos	7 días	N/A
3 días	Cacahuete (no para uso en California)	7 días	3/año*

* año = calendario año

HIERBAS

PHI	Cosecha	Tiempo	No. máximo de Aplicaciones
1 día	Hierbas (angélica, melissa, albahaca, borraja, pimpinela, manzanilla, menta gatuna, perifollo (seco), cebolletas, salvia sclarea, cilantro, hierba de San Pedro, cilantro, curry, eneldo, marrubio, hisopo, lavanda, hierba limón, levístico, caléndula, mejorada, menta, capuchina, perejil, menta poleo, romero, ruda, salvia, ajedrea, laurel, tanaceto, tarragón, tomillo, gaultheria, asperula odorata, y ajeno)	5 días	3/cosecha o 5/año*
7 días	Menta	4 días	3/cosecha o 4/año

* año = calendario año

PASTO, CÉSPED, PLANTAS Y ORNAMENTALES DE EXTERIOR CRIADAS EN MACETEROS (HERBÁCEAS Y LEÑOSAS)

Pulverice uniformemente el follaje hasta que gotee. La cobertura uniforme de la superficie superior e inferior de las hojas es esencial para un control eficaz de los insectos. No realice aplicaciones con una frecuencia menor de 7 días.

INVERNADEROS (NO COMERCIALES)

Realice tratamientos de áreas localizadas de plantas ornamentales donde se anticipa que ocurran problemas de plagas en lugar de tratamientos generales de toda el área. No aplique este producto más de 10 veces por año dentro de un invernadero. Si este producto está siendo usado para el control de pulgones, gusanos minadores de

vegetales, ácaros araña y/o polilla diamantada, no lo aplique más de 6 veces al año dentro de un invernadero.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contaminar el agua, comestibles o alimentos a través del almacenamiento y eliminación.

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: Almacene este producto en su envase original y manténgalo en un área de almacenamiento segura fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

ELIMINACIÓN DEL ENVASE: Si está vacío: El envase no es rellenable. No lo vuelva a usar o rellenar. Colóquelo en la basura o reciclado si está disponible. **Si está parcialmente lleno:** Llame a su agencia local de residuos sólidos para instrucciones de eliminación. No coloque nunca producto no usado en una alcantarilla interna o externa.

GARANTÍA

El vendedor garantiza que este producto cumple con la descripción química en esta etiqueta y encaja razonablemente para los fines indicados en esta etiqueta solamente cuando se usa de acuerdo con las instrucciones en condiciones normales. En el máximo grado permitido por la ley, esta garantía no se extiende al uso de este producto contrario a las instrucciones de la etiqueta, o bajo condiciones de uso anormales, o bajo condiciones no razonablemente previsibles por el vendedor. El vendedor no hace ninguna otra garantía, expresa o implícita.

(NEU-081214A)
0814(01)